



OXAGRO
Biotecnologías Agrícolas

Bio

CATALOGO

DE PRODUCTOS

En OXAGRO nos dedicamos a maximizar el valor de los cultivos agrícolas brindando productos de alta efectividad y eficiencia, haciendo uso principalmente de bioestimulantes y microorganismos de la mejor calidad y formulación para acompañar al agricultor en cada etapa de su cultivo. Nuestra prioridad es que el agricultor gane siempre más teniendo cultivos de alto rendimiento y de la mejor calidad que el mercado actual demanda. Nuestro profesionalismo es lo que nos distingue, siempre brindando el mejor servicio y no dejándote solo cuando más lo necesitas estamos para ti con la mejor asistencia técnica, y herramientas OXAGRO.



MAXIMIZANDO EL VALOR DE TUS CULTIVOS





VALORES

Capacidad – Honestidad –
Responsabilidad – Servicio

MISION

Desarrollar herramientas de alta
calidad y eficiencia para el campo,
cubriendo las necesidades en sus
cultivos al mejor costo – beneficio,
diferenciándonos del mercado con
moléculas específicas y sustentables
para así obtener cultivos de mayor
cantidad y calidad

VISION

Ser de referencia mundial en el desa-
rrollo e innovación de herramientas
para el campo de la mejor calidad y
sustentabilidad

BIOESTIMULANTES



FULL-ROOT



Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

OXAGRO
Biotecnologías Agrícolas

FULL-ROOT

Regulador de crecimiento

Producto especialmente diseñado para inducir y estimular el crecimiento de raíces y el engrosamiento de tallos. Su formulación se basa en una mezcla balanceada de hormonas “enraizadoras”,

Composición garantizada	p/v
Ingrediente Activo	
Fosforo.....	20.0%
Nitrógeno.....	04.0%
Ácido Indolbutirico (IBA).....	2800ppm
Ácido Naftalanacetico (ANA).....	200ppm
Citocininas.....	500ppm
Ácidos Fúlvicos.....	05.0%
Tiamina.....	200ppm
Acondicionadores e inertes.....	70.0%
Total.....	100.0%

Cultivo	Dosis	Observaciones
Tierra ó Sustrato para charolas	125 a 250 ml en el volumen de agua suficiente para humedecer 100 Kg de sustrato	Use la dosis baja en temperaturas menores a 20°C y la dosis alta en temperaturas mayores a 20°C
Almácigos y charolas	100 ml por cada 200 L de agua	Una vez por semana. Iniciar las aplicaciones en la segunda semana de desarrollo de la planta
Trasplante	400 ml por cada 100 L de agua	Aplicar una semana después del trasplante, dirigiendo la aplicación a la base de la planta.
Riego por goteo	1l/Ha	Diluir el producto en el agua de riego. Aplicar en la segunda, tercera y cuarta semana después del trasplante

1 lt 

5 lt 

20lt 

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos





Cyttox

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos



Cytox

Regulador de crecimiento

Biorregulador de crecimiento con alta concentración de citocininas 6-Benziladinina en específico para desencadenar varios mecanismos a nivel fisiológico y anatómico.

Composición garantizada
 Ingrediente activo
 6-benziladinina [N-(fenilmetil)-1H-purina-6amina].....1.9%

Cultivo	Dosis	Observaciones
Chile	50-100 mL/100 L 50-100mL/100 L 100-150 mL/100 L	Mejorar el desarrollo inicial de la planta y estimular braceo: Al prendimiento cuando inicien síntomas de brotación. Impulsar crecimiento de fruto: A los primeros frutos amarrados y repetir de 2 a 5 días después de cada corte. Reactivar el cultivo: Cuando la planta manifieste síntomas de envejecimiento
Cebolla	50-100 mL/100 L	Mejorar uniformidad y/o tamaño de bulbos. Primera aplicación en el momento de la iniciación del bulbo (cuando la planta tenga de 2 a 4 hojas) y segunda aplicación 15-30 días después.
Frijol	50-100 mL/100 L	Mejorar uniformidad y tamaño de vainas, aplicar al amarre de las primeras vainas y repetir 15 días después.
Tomate	100-150 mL/100 L	Impulsar el crecimiento del fruto. Aplicar al (llenado de frutos) cuaje de los primeros frutos y repetir cada 17-21 días.
Melón, sandía y pepino	50-100 mL/100 L 100-150 mL/100 L	Mejorar el desarrollo de la planta, aplicar cuando la planta tenga de 3-5 hojas verdaderas. Para estimular crecimiento del fruto, aplicar a la aparición de flores femeninas, repitiendo cada 7-8 días mientras existan flores -fruto que se deseen estimular.
Manzano	5-8 lt/ha en 1000 lt de agua	Red Delicious: Para el raleo de frutos. Aplicar cuando el tamaño de frutos alcance un promedio entre 10 y 15 mm de diámetro y cuando las temperaturas aumenten mayores de 15°C después de la aplicación. Se puede combinar con ACLAROX en variedades más difícil de ralear. Golden Delicious: Para el raleo de frutos. Aplicar cuando el tamaño de frutos alcance un promedio de entre 9 y 13 mm de diámetro y cuando las temperaturas aumenten mayores de 15°C después de la aplicación. Se puede combinar con ACLAROX.
Algodón	100-150 mL/100 L	Aplicar en prefloración para generar mayor número de flores, de mayor tamaño y de mejor calidad.

1 lt



5 lt



Via Foliar

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
 Maximizando el valor de tus cultivos





Giberox

G4+GA7

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

 **OXAGRO**
Biotecnologías Agrícolas

Giberox

G4+GA7

Regulador de crecimiento

Fitorregulador para aplicar en pulverización foliar. Resulta efectivo para prevenir la herrumbre (russeting) así como para inducir el cuajado. Presentado en forma de concentrado soluble puede ser utilizado en:

Composición garantizada	%
Ingrediente activo	
Giberelinas A4 y A7.....	10.0%
(equivalente a 10gr de I.A./L)	
Ingredientes inertes	
Disolventes y dispersantes	
No mas de.....	90.0%
Total.....	100.0%

Cultivo

Dosis

Observaciones

MANZANO

5-20gr/hl

Para prevenir la herrumbre (russeting) de las manzanas.

Aplicar al aire libre, la 1ª aplicación se dará al final de la caída de los pétalos
Efectuar máximo 4 aplicaciones por campaña a intervalos de 7-10 días



Via Foliar

100gr



Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

OXAGRO
Biotecnologías Agrícolas



MOXIN

ANA+AMIDA



Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

 **OXAGRO**
Biotecnologías Agrícolas

MOXIN

Regulador de crecimiento ANA+AMIDA



Hormonas auxinas y aminoácidos esenciales para el amarre de flor y frutos que ayudan a aumentar la calidad y rendimiento de los cultivos, acelera la maduración de ciertas hortalizas, aumenta la fijación de la raíz, haciendo más temprana la floración y amarre de frutos, uniformidad, grados brix, color y enraizamiento.

Composición garantizada	% peso
Ingrediente activo	
1-naftalenacetamida.....	1.20%
1-acido naftalanacetico.....	0.45%
Ácido glutámico.....	20.0%
Ácido gamma-aminobutírico.....	20.0%
Silicio.....	40.0%
Inertes.....	18.35%
Total.....	100.0%

Cultivo	Dosis gr/ha	Observaciones	Aplicacion
Chile	60 a 120 gr	Mayor amarre de fruto, uniformidad de los frutos, mejores tamaños, aumento en fruto de primera, aumento en rendimiento total.	Aplicar durante el inicio de floración.
Nogal	120 a 150 gr	Amarre de fruto, Mayores rendimientos	Al inicio de la floración.
Manzano	120 a 150 gr	Mayor rendimiento, amarre de fruto	Realizar la primera aplicación en etapa de crecimiento vegetativo.
Melón, sandia y pepino	60 a 120 gr	Mayor amarre, uniformidad del fruto, aumento en calidad, mayor grados Brix y rendimiento total.	Al inicio de la floración femenina
Tomate	60 a 120 gr	Mayor amarre de fruto, uniformidad del fruto, mejor color, mayor grados Brix, aumento en rendimiento total.	Aplicar durante el inicio de floración.
Algodón	120gr	Amarre de flor y bellotas	En el desarrollo vegetativo al inicio de formación de yemas florales y antes del primer riego de auxilio.



Via Foliar

1Kg



Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

OXAGRO
Biotecnologías Agrícolas



BROTOX

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

OXAGRO
Biotecnologías Agrícolas



BROTOX

Regulador de crecimiento

INFORMACION GENERAL:

BROTOX es un regulador de crecimiento que estimula una brotación mas uniforme de yemas vegetativas y florales, adelantando el periodo de cosecha y mejorando la calidad de la fruta en cultivos de manzano, zarzamora, durazno, vid y nogal.

INGREDIENTE ACTIVO

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN VOL
------------------------	----------

Ingrediente Activo

Thidiazuròn.....42.5%
(N-Fenil-N'-1,2,3-tiadazol-5-il urea)

Ingredientes Inertes

diluyente y compuestos relacionados.....57.5%

Total.....100.0%

Cultivo

Dosis ml/Ha

Manzano

30-40 ml en pulsado, seguido de una aplicación en Pre-brotacion de 40-60 ml

Durazno

60 a 80 ml en Pre-brotacion

Nogal

40-100 ml en Pre-brotacion

Vid

Aplicar de 1-3 ml después de la brotación, 2da aplicación 1-3 ml dos semanas después

Zarzamora

1ra Aplicar 10 a 25 ml antes de defoliación, 2da después de defoliación de 5-12.5 ml



Via Foliar

1 lt



Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

OXAGRO
Biotecnologías Agrícolas

ACTIVADORES METABOLICOS



ACTIVA·Tp
Uso Agrícola®

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

OXAGRO
Biotecnologías Agrícolas®



Eleva el nivel de elaboración de ATP, ADP, AMP cuando la producción de éstos es deficiente por el estrés de calor, de frío, de agua o de distorsión por desequilibrios fisiológicos.

Incrementar el nivel de metabolitos responsables de la unión de la energía fotosintética con el fósforo

Composición garantizada	%
Ingrediente activo	
Ácido 2-aminopentanodioico.....	98.0%
Tiamina (Vitamina B1).....	2.0%
Total.....	100.0%

Cultivo	Dosis gr/Ha	Observaciones
Cebolla		Activar plantas bajo condiciones de estrés de frío.
Nogal		Activar plantas bajo condiciones de estrés de calor.
Manzano	Riego	
Durazno	150- 500gr	Activar plantas bajo condiciones de estrés de agua.
Chile	Foliar	
Maiz	50 a 150gr	Activar plantas bajo condiciones de estrés por desequilibrios fisiológicos (causados por herbicidas, reguladores de crecimiento, exceso de fertilizante).
Pepino		
Fresa		
Tomate		
Melon		
Sandia		
Algodon		



ALGANOX

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

OXAGRO
Biotecnologías Agrícolas



Alganox fertilizante foliar derivado de extracto de *Ascophyllum nodosum* para ser aplicado al cultivo en un programa nutritivo balanceado diseñado para maximizar la producción en hortalizas, cultivos no alimenticios y ornamentales.

Composición garantizada	%/p
Algas Marinas (<i>Ascophyllum nodosum</i>).....	20.0%
Nitrogeno.....	1.03%
Fosforo.....	2.0%
Potasio.....	10.0%
Aminoacidos.....	2.0%
Elementos relacionados.....	64.97%
Total.....	100.0%

Cultivo	Dosis lt/Ha	Observaciones
Hortalizas	1.5 a 3	Aplicar cuando el cultivo pase por situaciones de estrés. via foliar, pudiendo ser aplicado con cualquier fertilizante y con los equipos de aplicación usados para pesticidas. Aplicar con suficiente agua para obtener una buena cobertura del cultivo.
Frutales	2 a 4	
Granos	1 a 2	Aplicar cuando el cultivo este en diferenciacion celular o en situaciones de estrés.



Complejo de aminoácidos
esenciales para las plantas en
situaciones de estrés hídrico,
temperatura, intoxicación, altas
demandas de energía etc.

AMINOX[®]

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

 **OXAGRO**
Biotecnologías Agrícolas

AMINOX[®]

Complejo de aminoácidos esenciales para las plantas en situaciones de estrés hídrico, temperatura, intoxicación, altas demandas de energía etc.

Composición garantizada	% peso
Ingrediente activo	
Total Aminoácidos.....	32.0%
Aminoácidos Libres.....	24.7%
Nitrogeno.....	3.0%
Fosforo	3.0%
Potasio.....	3.0%
Inhertes.....	59.0%
Total.....	100.0%

Cultivo	Dosis L/Ha	Observaciones
Hortalizas	1.5 a 3	Aplicar cuando el cultivo pase por situaciones de estrés.
Frutales	2 a 4	via foliar, pudiendo ser aplicado con cualquier fertilizante y con los equipos de aplicación usados para pesticidas. Aplicar con suficiente agua para obtener una buena cobertura del cultivo.
Granos	1 a 2	Aplicar cuando el cultivo este en diferenciación celular o en situaciones de estrés.

VIA FOLIAR



20L



MEJORADORES DE SUELO



Acidos polihidroxicarboxilicos

POLIOX-PLUS Es un producto diseñado para desbloquear suelos y bajar la alcalinidad, logrando con ello que los nutrientes sean tomados por las plantas y así coadyuvar un mejor desarrollo en esta.

POLIOX-PLUS®

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

**OXAGRO**
Biotecnologías Agrícolas

POLIOX-PLUS®

POLIOX-PLUS Es un producto diseñado para desbloquear suelos y bajar la alcalinidad, logrando con ello que los nutrientes sean tomados por las plantas y así coadyuvar un mejor desarrollo en esta. Además, este producto posee carga orgánica que está constituida por acidos polihidroxicarboxilicos que mejora la condición del suelo ya que ayuda a la floculación de las partículas del mismo. El uso de a demostrado que el peso de frutos, calidad y firmeza de la fruta incrementando el rendimiento de los cultivos

Composición garantizada


Ingrediente activo	%
Ácidos	
Polihidroxicarboxilicos.....	25.0%
Ácidos Húmicos.....	5.0%
Acondicionadores e inertes.....	70.0%
Total.....	100.0%

Cultivo	Dosis	Observaciones
Chile Nogal Manzano Cebolla Melón Sandia Algodón	2 - 5L	Aplicar al suelo a partir de los 10 días y repetir cada 15 días.



VIA SUELO





ImpulsoX

8-24-8+Carbohidratos

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos



Impulsox

8-24-8+Carbohidratos

IMPULSOX, aumente su rendimiento agrícola con nuestro fertilizante avanzado, diseñado específicamente para satisfacer las necesidades nutricionales de sus cultivos. Nuestra fórmula única contiene un equilibrio perfecto de 8% de nitrógeno, 24% de fósforo, 8% de potasio y carbohidratos, junto con ácidos fúlvicos y humicos además de tener un pH casi neutro que actúa como desbloqueante de nutrientes, asegurando que sus plantas obtengan exactamente lo que necesitan para un crecimiento óptimo.

Composición garantizada	PP/V
Ingrediente Activo:	
Nitrogeno.....	8.0%
Fosforo.....	24.0%
Potasio.....	8.0%
Carbohidratos.....	10.0%
Acidos humicos.....	3.0%
Inhertes.....	47.0%
Total.....	100.0%

Cultivo	Dosis	Observaciones
Nogal Manzano Alfalfa Chile Maíz Pepino Fresa Tomate Melón y Sandia Algodon	5 a 10l	Aplicar cada semana, 5 L en etapa temprana y 10L para dar más vigor a la planta y mostrar todo su potencial genético, a partir de floración y hasta el término de la cosecha.

INSECTICIDAS

Acaricida

Abamectin actúa estimulando la liberación presináptica de un neurotransmisor inhibitorio, el ácido gamma-aminobutírico (GABA). Los ácaros quedan irreversiblemente paralizados y mueren. Etoxazole actúa inhibiendo la biosíntesis de quitina.

ETOX[®] 

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

**OXAGRO**
Biotecnologías Agrícolas[®]

ETOX[®]



Etox es un acaricida de amplio espectro que combina el mecanismo de acción de dos ingredientes activos:

Abamectin actúa estimulando la liberación presináptica de un neurotransmisor inhibitorio, el ácido gamma-aminobutírico (GABA). Los ácaros quedan irreversiblemente paralizados y mueren.

Etoxazole actúa inhibiendo la biosíntesis de quitina. Origina la alteración de la muda, del crecimiento y del desarrollo de los estados inmaduros (larvas y ninfas).

Composición garantizada

%

Ingrediente activo

Etoxazole: 2-(2,6-difluorofenil)-4-[4-(1,1-dimetiletil)-2-etoxifenil]-4,5-

dihidroxazol.....12.0%

abamectina (avermectina): avermectinas
80% de avermectina B1a

20% de avermectin B1b.....3.6%

Disolvente, dispersantes,
emulsificantes.....84.4%

Total.....100.0%

Cultivo	Plaga	Dosis mL/Ha
Aguacate (sl)	Araña roja	25 a 100ml por cada 100l de agua
Cebolla, Chile, Tomate, Papa, Papaya (3)	Araña roja Araña ciclamina	200 a 250ml
Granos (21)	Araña roja	125 a 250ml
Manzano, Peral	Araña roja	250 a 500ml



VIA FOLIAR

1L





Spinotetramat

Insecticida que contiene Spirotetramat. Es un inhibidor de la biosíntesis de los lípidos de tal manera que la muda no puede completarse , ocasionando la muerte del insecto. Una vez que el ingrediente activo ingresa a la planta, Spirotetramat se hidroliza a su forma enólica.



SPINOX

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos



OXAGRO
Biotecnologías Agrícolas



Insecticida que contiene Spirotetramat. Es un inhibidor de la biosíntesis de los lípidos de tal manera que la muda no puede completarse, ocasionando la muerte del insecto. Una vez que el ingrediente activo ingresa a la planta, Spirotetramat se hidroliza a su forma enólica. Como ácido débil, este compuesto es móvil dentro del floema de la planta, por tanto, se puede mover acropetala y basipetalamente. Debido a su ambimovilidad, el nuevo follaje desarrollado después de la aplicación también está protegido.

Composición garantizada

%/P

Ingrediente activo

Spirotetramat

(cis-4-(etoxicarbonilo)8-metoxi-3-(2,5-xilil)-1-azaspiro[4,5]
(dec-3-en-2-ona).....

15.3%

(Equivalente a 150 g de I.A./L)

Ingredientes inertes Diluyente

y compuestos relacionados.....84.7%

Total.....100.0%

Cultivo	Plaga	Dosis lt/Ha	Observaciones
Cebolla (7)	Trips (Thrips tabaci)	• 0.3-0.5	- Realizar 3 aplicaciones dirigidas al cogollo a intervalos de 7 días. Época de aplicación, en desarrollo vegetativo. - Realizar una aplicación al follaje cuando se detecten los primeros pulgones lanígeros en los brotes. - Aplicación al follaje. Realizar 2 aplicaciones a intervalos de 15 días. - Aplice cuando se detecten las primeras ninfas.
Ajo (14)	Piojo harinoso(Planococcus ficus)	• 0.6-0.8	
Tomate de cáscara		• 0.6-0.8	
Vid (7)	Pulgón verde(Myzus persicae)	• 0.6-0.8	
Col de Bruselas (3)	Pulgón lanígero(Eriosoma lanigerum)		
Manzano	Mosca		
Aguacate	blanca(Tetraleurodes perseae)		
Frijol	Mosquita blanca(Bemisia tabaci)		
Papa	Ninfas de pulgón saltador(Bactericera cockerelli)		
Frijol ejotero	Ninfas de mosquita blanca (Bemisia spp.)		
Chile*	Pulgón (Aphis gossypii)		
Jitomate*	Mosca blanca(Bemisia tabaci)		
Tomate de cáscara*			
Calabaza*			
Melón* Pepino*			
Sandía*			



Klinox

Insecticida

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos



Klinox

Insecticida

KLINOX® Insecticida perteneciente a la familia de las diamidas antranílicas. Se caracteriza por su actividad larvicida y prologado efecto residual. Posee actividad sistémica al ser absorbido por vía radicular cuando es aplicado al suelo y acción traslaminar cuando se aplica al follaje. Cuando se aplica en la fase temprana del ciclo de las plagas (deben programarse los tratamientos para el control de huevos o larvas recién eclosionadas), previene el crecimiento de las poblaciones, evitando que lleguen al umbral económico negativo para el cultivo.

Composicion garantizada	p/v
Ingrediente activo	
Clorantraniliprol.....	220.0 g/L (20.0%)
3-bromo-4'-cloro-1-(3-cloro-2-piridil)-2'	
-metil-6' (metilcarbamoil)pirazol-5-carboxanilida	
Otros ingredientes.....	780 g/L (80.0%)
Total.....	(100.0%)

Cultivo	Plaga	Dosis lt/Ha
Maíz Sorgo (14) Caña de azúcar (14)	Gusano cogollero Spodoptera frugiperda	75-125 ml
Nogal (10)	Barrenador del ruezno Cydia caryana	20 mL/100 L de agua
Piña (1)	Barrenador del fruto Thecla basilides	150 – 250 ml
Tomate de cáscara (1)	Gusano del fruto Heliothis zea	100 – 150 ml



COPRID

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos



OXAGRO
Biotecnologías Agrícolas



COPRID® Insecticida por vía sistémica y residual; actúa por contacto e ingestión y es absorbido tanto por vía radical como por las hojas pudiendo ser aplicado en aspersión foliar o al suelo. Los insectos tratados muestran inmediatamente los síntomas de envenenamiento con excitación y parálisis. Actúa como agonístico sobre el receptor nicotínico de la acetilcolina del sistema central, primero estimulando las membranas postsinápticas y después paralizando la conducción nerviosa.

Composicion garantiza	p/v
Ingrediente activo	
Imidacloprid.....	32.02%
1-(6-cloro-3-piridin-3-ilmetil) -N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina,	
Otros ingredientes.....	67.98%
Total.....	100.0%

Cultivo	Plaga	Dosis lt/Ha	Observaciones
ALGODON (14)	Mosca blanca Bemisia tabaci,	0.3 a 0.6 L/ha	Iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros Adultos. En poblaciones altas se debe de utilizar la dosis de 0.6 L/ha.
PAPA (7)	Mosca blanca Bemisia tabaci Pulgón saltador Paratrioza cockerelli	1.0 a 1.5 L/ha	Realizar la aplicación al momento de la siembra, asperjando los tubérculos y el fondo del surco antes de tapar la semilla.
CHILE (21)	Diabrotica Diabrotica spp. Pulgón saltador Paratrioza cockerelli Trips Frankliniella occidentalis	0.75 a 1.0 * L/ha	Iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros Adultos. En poblaciones altas se debe de utilizar la dosis de 0.6 L/ha.

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos





BYLAM

I n s e c t i c i d a

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

 **OXAGRO**
Biotecnologías Agrícolas



BYLAM® Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos provocando hiperexcitación, convulsiones, parálisis y finalmente la muerte. Produce el bloqueo en la conducción de los estímulos nerviosos principalmente por modificar la permeabilidad de las membranas de las células nerviosas a los iones sodio. También tiene actividad sobre huevos y adultos. Se caracteriza por su gran poder de volteo, por su protección persistente y por sus propiedades repelentes.

Composición garantizada	%p/v
Ingrediente activo:	
Lambda cialotrina.....	21.3%
Ingredientes inertes:	
Diluyente, dispersante y espesante.....	78.7%
TOTAL.....	100.0%

Cultivo	Plaga	Dosis lt/Ha	Observaciones
Algodonero (21)	Pulga saltona (Pseudatomoscelis seriatus)	100-150ml	Realice 2 aplicaciones al follaje, a intervalo de 14 días
Jitomate Chile (5)	Gusano alfiler (Keiferia lycopersicella)	100 a 150ml	Realice 2 aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días.
Brócoli, Col, Col de Bruselas, Coliflor (1)	Palomilla Dorso de diamante	100-150ml	Realice 2 aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días.
Maíz, Sorgo (15)	Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)	100 – 150ml	Realice 2 aplicaciones al follaje, a intervalos de 15 días.

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos





MEVY

I n s e c t i c i d a

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

 **OXAGRO**
Biotecnologías Agrícolas



MEVY

Insecticida

Diamida antranílica insecticida con efecto traslaminar. El modo de acción insecticida implica la activación no regulada de los canales receptores de rianodina, lo que lleva a un agotamiento interno de la reserva de calcio que perjudica la regulación de la contracción muscular. El producto también muestra la eficacia ovicida, ovi-larvicida y adulticida, dependiendo de la especie de plaga.

Composición garantizada	%P/V
Ingrediente Activo: ciantraniliprol: (3-bromo-1-(3-cloro-2-piridil)-4'-ciano-2'-metil-6'-(metilcarbamoil)pirazol-5-carboxanilida).....	18.66%
(Equivalente a 200 g/L a 20°C)	
Ingredientes Inertes: Dispersantes, espesantes, biocida, antiespumante, anticongelante y diluyente.....	81.34%
TOTAL.....	100.00%

Cultivo	Plaga	Dosis lt/Ha	Observaciones
Tomate de cascara Chile Jitomate	Minador de la hoja (Liriomyza sativae) Gusano Soldado (Spodoptera exigua) Pulgón Saltador (Bactericera cockerelli) Ninfas de Mosca Blanca (Bemisia tabaci)	250-500ml	Aplicación en riego por goteo: Realice 1 aplicación 10 días después del trasplante o cuando se presenten las primeras punzaciones sobre las hojas.
Melon Pepino Sandia Calabaza	Minador de la hoja (Liriomyza sativae) Gusano Soldado (Spodoptera exigua) Pulgón Saltador (Bactericera cockerelli) Ninfas de Mosca Blanca (Bemisia tabaci)	300-600ml	Aplicación en pretrasplante: Realice una aplicación un día antes del trasplante sobre el follaje de las plántulas. Utilice agua limpia para lavar las plántulas antes de que el residuo seque.
Brócoli, Col, Col de Bruselas, Coliflor	Palomilla Dorso de Diamante (Plutella xylostella) Pulgón cenizo de la col (Brevicoryne brassicae) Gusano falso medidor (Trichoplusia ni)	7.5 - 12.5 mL /1000 plantas	Pretrasplante: Realice una aplicación al follaje un día antes del trasplante. Volumen de aplicación 5 L de agua/1000 plantas.s.
Papa	Ninfas de Mosca Blanca Bemisia tabaci Pulgón Aphis gossypii	500 - 600 mL/ha	A la siembra: Realizar una única aplicación al fondo del surco sobre los tubérculos de papa al momento de la siembra. Realizar la aplicación en al menos 300 L de agua/ha.

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos





THIMON 75

Insecticida

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

 **OXAGRO**
Biotecnologías Agrícolas



THIMON 75

Insecticida

Insecticida, neonicotinoide (tiаметoxam) ascendente sistémico (acropétalo). Aplicación muy versátil, es absorbido por hojas y raíces, controlando insectos chupadores en cultivos hortícolas. Actúa sobre los receptores de acetilcolina en el sistema nervioso de los insectos. Paraliza a los insectos, causándoles la muerte por inanición. Es amigable con el medio ambiente y las organizaciones benéficas.

Composición garantizada	%P/P
Ingrediente activo	
TIAMETOXAM:	
(EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-	
5-metil 1,3,5-oxadiazinan-4-iliden(nitro)amina.....	75.0%
(Equivalente a 750 g. de i.a./ Lt)	
INGREDIENTES INERTES	
Adhesivo, humectante,	
agente penetrante.....	25.0%
Total.....	100.0%

Cultivo	Plaga	Dosis lt/Ha	Observaciones
PEPINO CALABAZA CALABACITA CHAYOTE MELÓN SANDIA (SL)	MOSCA BLANCA (Bemisia tabaci) PULGÓN (Aphis gossypii)	100 a 150 ml	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 322 – 422 L de agua/ha.
PAPA JITOMATE TOMATE DE CÁSCARA CHILE (SL)	PULGÓN SALTADOR (Paratrioza cockerelli) PULGÓN VERDE (Myzus persicae)	200 a 250ml	Realizar dos aspersiones al follaje, la primera a los 5 días después del trasplante; la segunda aplicación a los 14 días después de la primera. Volumen de aplicación 550-650 L/ha
AGUACATE (SL)	TRIPS (Scirtothrips perseae) AGALLA DE LA HOJA (Trioza anceps) CHICHARRITA DEL AGUACATE (Idona minuenda)	100 a 150ml	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 1650 – 1805 L de agua/ha.
LIMONERO (SL)	PULGÓN NEGRO DE LOS CÍTRICOS (Toxoptera aurantii)	100 – 150 ml	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 800 – 1000 L de agua/ha.



Benzox

INSECTICIDA

POLVO HUMECTABLE

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

**OXAGRO**
Biotecnologías Agrícolas

Benzox

INSECTICIDA

POLVO HUMECTABLE

Benzox es un insecticida del grupo de las Avermectinas, de ingrediente activo Emamectin benzoate, el cual controla eficazmente larvas de lepidópteros. El ingrediente activo ingresa a la hoja en forma translaminar. Esta penetración resulta en un reservorio de ingrediente activo, que proporciona actividad residual en los cultivos frente a los insectos objetivos que se alimentan de ellos.

Composición garantizada	%P/P
Ingrediente activo	
BENZOATO DE EMAMECTINA:	
Benzoato de	
Emamectina.....	5.0%
(Mezcla de Benzoato de Emamectina B1a y Benzoato de Emamectina B1b (con un contenido No menor al 94.16% de Benzoato de Emamectina B1a y no mayor al 2.25% de Benzoato de Emamectina B1b))	
Ingredientes inertes	
Diluyente y compuestos	
relacionados.....	95.0%
Total.....	100.0%

Cultivo	Plaga	Dosis gr/Ha
Brócoli Coliflor Col de Bruselas (7)*	Palomilla dorso de diamante Plutella xylostella	200 - 300
Nogal (10)	Barrenador del ruezno Cydia caryana	250
Tomate (Jitomate) (7)	Gusano soldado Spodoptera exigua	200 - 300
Maíz (7)	Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)	58 - 77

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
 Maximizando el valor de tus cultivos





SADINOX

INSECTICIDA

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos



OXAGRO
Biotecnologías Agrícolas



SADINOX

INSECTICIDA

SADINOX® es un insecticida que pertenece a la clase de sustancias químicas llamada spinosinas. Se deriva de un producto natural producido por la bacteria *Saccharopolyspora spinosa*. SADINOX® Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, provocando una sobreestimulación y parálisis subsiguiente. Es eficaz contra una variedad de plagas, incluyendo orugas, escarabajos y otros insectos masticadores y chupadores.

Composición garantizada	%P/PV
Ingrediente Activo	
Spinetoram	
(mezcla de Spinosyn J y Spinosyn L).....	6.0%
Ingredientes inertes	
Antiespumante, dispersante, humectante, anticongelante, biocida, espesante y vehículo.....	94.0%
Total.....	100.00%

Cultivo	Plaga	Dosis ml/Ha	Observaciones
Tomate Berenjena Chile Pimiento morrón Habanero Tomate de cáscara (SL)	Minador de la hoja <i>Liriomyza sativae</i> Trips <i>Frankliniella occidentalis</i> Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	333.33 - 500 300 - 400 300 - 400	Aplicar cuando se detecte un 20% de hojas / folíolos con minas y/o larvas vivas. Realizar las aplicaciones dirigidas al follaje con intervalos de 7 días, cuando se detecten dos trips por flor. Volumen de aplicación 400 L/ha. Control de larvas en todos los estadios. Aplicar cuando la inspección indique que se ha alcanzado el umbral económico.
Cebolla, Ajo, Cebollín (1)	Trips de la cebolla <i>Thrips tabaci</i> Minador de la hoja <i>Liriomyza huidobrensis</i>	250 - 300	Realizar una sola aplicación al follaje; volumen de aspersión de 550 - 650 L de agua/Ha.
Maíz (1)	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	75 - 100	Dirijase la aspersión a las hojas y al cogollo cuando se observe de un 30-40% de plantas con daño y/o larvas vivas. Aplíquese preferentemente sobre estados iniciales de la plaga.
Nogal pecanero (14))	Gusano barrenador del ruzno <i>Cydia caryana</i> Gusano barrenador de la nuez <i>Acrobasis nuxvorella</i>	50 - 60 mL/100 L de agua	Realizar una aplicación al detectar al menos 5 adultos por trampa por noche. Adicionar 0.5 ml de coadyuvante Realizar una aplicación al detectar las primeras penetraciones de la plaga. Adicionar 0.5 ml de coadyuvante.

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
 Maximizando el valor de tus cultivos





Deltrox

PLUS

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

 **OXAGRO**
Biotecnologías Agrícolas



DELTROX PLUS actúa afectando el sistema nervioso de los insectos y ácaros, lo que les causa parálisis y eventualmente la muerte. insecticida y acaricida sintético perteneciente a la familia de los piretroides. Se utiliza para controlar una amplia variedad de insectos que pueden dañar los cultivos, como pulgones, escarabajos, orugas, y ácaros.

Composición garantizada	%P/PV
Ingrediente Activo	
Deltametrina.....	11.0%
Ingredientes inertes	
Antiespumante, dispersante, humectante, diluyente.....	89.0%
Total.....	100.00%

Cultivo	Plaga	Dosis ml/Ha	Observaciones
Gramíneas (1)	Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)	125 a 150	Iniciar las aplicaciones cuando se presenten los primeros individuos
Jitomate Chile (1)	Gusano soldado Guassano falso medidor	200 a 250	Iniciar las aplicaciones cuando se presenten los primeros individuos
Cebollín Cebolla Ajo (1)	Tips	200 a 250	Iniciar las aplicaciones cuando se presenten los primeros individuos



Bulwark

DUO

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos





Innovador insecticida combina dos poderosos ingredientes activos, imidacloprid y betaciflutrin, para ofrecer una solución eficaz y versátil contra una amplia gama de plagas. El imidacloprid, por su acción sistémica, actúa como un potente neurotóxico que interfiere con el sistema nervioso de los insectos, brindando un control efectivo a largo plazo. Complementado con betaciflutrin, un piretroide sintético de acción rápida, este producto proporciona un efecto de choque instantáneo al entrar en contacto con las plagas

Composición garantizada	%P/PV
Ingrediente Activo	
Ingrediente activo:	
Imidacloprid:	
(E)1-(6-Cloro-3-Piridilmetil)- N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina.....	20.0%
(Equivalente a 210 g de i.a./L a 20°C)	
Betacyfluthrin	
3-(2,2-dicloro-vinil)-2,2-dimetil-ciclopropano-ácido Carboxilicociano-(4-fluoro-3-fenoxi-fenil)-metil éster.....	9.0%
(Equivalente a 90 g de i.a./L a 20°C)	
Ingredientes inertes.....	71.0%
Total.....	100.00%

Cultivo	Plaga	Dosis lt/Ha	Observaciones
Chile Papa Tomate de cáscara	Pulgón Myzus persicae	0.20 – 0.25	Aplique cuando se detecten los primeros pulgones. Utilizar suficiente agua.
Jitomate	Gusano soldado Spodopera exigua	0.15 – 0.25	Aplique cuando detecten las primeras larvas. Repetir a intervalo de 7 días. Utilizar la suficiente cantidad de agua.
Algodonero (14)	Mosca blanca Bemisia tabaci	0.2 – 0.3	Aplique cuando se detecten los primeros pulgones y chinches que atacan la bellota. Utilizar suficiente agua.
	Chinche Lygus Lygus sp.	0.25 – 0.3	
	Pulgón del algodonero Aphis gossypii Chinche del algodonero Pitedia sayi	0.4-0.5	Aplique cuando detecten los primeros Insectos (moscas blancas y/o chinches). Repetir a intervalo de 7 días, hasta un máximo de 3 aplicaciones.
Calabaza, Calabacita Pepino, Melón, Sandia (3)	Pulgón Aphis gossypii	0.2 - 0.3	Aplique cuando se detecten los primeros pulgones. Utilizar suficiente agua.

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
 Maximizando el valor de tus cultivos





TriGuard

Insecticida

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos





TriGuard

Insecticida

TriGuard es la elección ideal para agricultores comprometidos con la protección de sus cultivos contra las amenazas de plagas. Esta fórmula avanzada combina tres poderosos ingredientes activos: clorantniliprol, deltametrina y spinetoram, proporcionando una defensa integral contra una amplia gama de insectos perjudiciales. Proporciona una protección de larga duración, reduciendo la necesidad de aplicaciones frecuentes.

Composición garantizada	%P/PV
Ingrediente Activo	
Ingrediente activo:	
Clorantniliprol 3-bromo-N-[4-cloro-2-metil-6-[(metilamino) carbonil] fenil]-1-(3-cloro-2-piridinil) 1H-pirazol-5- carboxamida.....	10.0%
Deltametrina	3.3%
(S)-α-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato	
Spinetoram Mezcla de los estereoisómeros J y L.....	2.0%
Ingredientes inertes	
Antiespumante, dispersante, humectante, diluyente.....	
Total	100.00%

Cultivo	Plaga	Dosis ml/Ha	Observaciones
Maíz (21) Sorgo (30)	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	150-333	Aplicación foliares, dirigida al follaje y cogollo de la planta, asegurando una buena cobertura al detectar los primeros brotes de la plaga.
Nogal (7)	Gusano barrenador del ruezno <i>Cydia caryana</i>	200 - 300+	Aplicación foliares, dirigida al follaje y cogollo de la planta, asegurando una buena cobertura al detectar los primeros brotes de la plaga.
Tomate, Chile Papa Tomate de cáscara (1)*	Ninfas de mosquita blanca <i>Bemisia tabaci</i> Ninfas de pulgón saltador <i>Bactericera cockerelli</i> Gusano Soldado <i>Spodoptera exigua</i>	400 - 500+	Inicie las aplicaciones cuando se observen las primeras infestaciones y realice 3 aplicaciones a intervalos de 7 días..
Calabaza, Calabacita Pepino, Melón, Sandía (3)	Pulgón <i>Aphis gossypii</i> Minador de la hoja <i>Liriomyza sativae</i>	400 - 500+	Inicie las aplicaciones cuando se observen las primeras infestaciones y realice 3 aplicaciones a intervalos de 7 días..

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
 Maximizando el valor de tus cultivos





ProLay

Insecticida

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

 **OXAGRO**
Biotecnologías Agrícolas



ProLay es un avanzado insecticida diseñado para ofrecer una protección efectiva contra una amplia variedad de plagas agrícolas. Su fórmula única, basada en thiacloprid, un neonicotinoide de última generación, proporciona una solución potente y de acción rápida para el control de insectos. El modo de acción implica su interacción con los receptores de acetilcolina en el sistema nervioso central de los insectos. La interrupción de la señal nerviosa conduce a la parálisis y eventualmente a la muerte del insecto.

Composición garantizada	%P/PV
Ingrediente Activo	
Ingrediente activo:	
Thiacloprid	
(Z)-3-(6-cloro-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidin-2-ilidencianamida.....	41.0%
(Equivalente a 430 g de i.a./ L)	
Ingredientes inertes	
Antiespumante, dispersante, humectante, diluyente.....	59.0%
Total.....	100.00%

Cultivo	Plaga	Dosis lt/Ha	Observaciones
Chile (3)	Picudo del chile, <i>Anthonomus eugenii</i>	0.25-0.3 L/ha	Iniciar las aplicaciones cuando en el cultivo se encuentren los primeros botones florales dañados; o bien al detectar los primeros adultos de picudo en el cultivo
Algodonero (14)	Mosca blanca <i>Bemisia argentifolii</i>	0.1- 0.15 L/ha	Iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros insectos adultos en el tercio superior de la planta, (4ª y 5ª hoja axilar).
Manzano (30)	Palomilla de la manzana <i>Cydia pomonella</i>	22 - 30 mL/100 L agua	Aplicar cuando se observen los primeros insectos, repetir en caso de reinfestación. Utilice como mínimo 1000 L de agua/ha
Papa (7)	Paratrioza cockerelli Pulgon Myzus	0.15 - 0.20 L/ha	Iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros insectos adultos, repetir en caso necesario a intervalos de 7 días.

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos





Metagus

Insecticida

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

OXAGRO
Biotecnologías Agrícolas



Metagus

Insecticida

METAGUS es un innovador producto formulado con metoxifenocida, un compuesto químico avanzado con propiedades excepcionales. Actúa principalmente por ingestión y en algunos casos por contacto; con actividad sistémica en las raíces. No posee propiedades traslaminar ni sistémicas por el floema. Regulador del crecimiento de los insectos (RCI) con un novedoso modo de acción "MAC" (compuesto acelerador de la muda).

Composición garantizada	%P/PV
Ingrediente Activo	
Ingrediente activo:	
Methoxyfenozide	
ácido benzoico, 3- metoxi-2-metil-2(3,5-dimetilbenzoil)-2-(1,1-dimetil etil) hidracida.....	25.0%
(Equivalente a 255 g de i.a./ L)	
Ingredientes inertes	
Antiespumante, dispersante, humectante, diluyente.....	75.0%
Total.....	100.00%

Cultivo	Plaga	Dosis lt/Ha	Observaciones
Nogal Pecanero	Gusano barrenador del ruezno (Cydia caryana)	30 – 40 mL/100 L de agua	Aplicar cuando se observen los primeros insectos. Utilice como mínimo 1000 L de agua/ha
	Gusano Barrenador de la nuez (Acrobasis Nuxvorella)		
Algodonero	Gusano Soldado (Spodoptera exigua)	120-250	Iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros insectos adultos, repetir en caso necesario a intervalos de 7 días.
Maíz (30)	Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)	120 - 200	Iniciar las aplicaciones cuando se observen las primeras larvas.

FUNGICIDAS



Stroby

Fungicida

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

OXAGRO
Biotecnologías Agrícolas



Stroby

Fungicida

STROBY, es ideal para una gama de cultivos, incluyendo cereales, frutales y hortalizas, asegurando que tus plantas permanezcan saludables y productivas. Con azoxistrobin inhibiendo la respiración mitocondrial de los hongos y ciproconazol deteniendo la producción de ergosterol, este fungicida actúa eficientemente tanto de manera preventiva como curativa. Su efecto sistémico significa que una vez absorbido por las plantas, proporciona una defensa duradera.

Composición garantizada	%P/PV
Ingrediente Activo	
Azoxistrobin.....	20.0%
((E)-2-[2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi] fenil]-3-metoxiacrilato de metilo)	
Ciproconazol.....	8.0%
1-[4-[(2-ciclopropil-2-hidroxi-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)etil]fenil]piperazina.	
Inertes.....	72.0%
Total.....	100.0%

Cultivo

Objetivo Biológico

Nombre científico

Dosis ml/Ha

Algodonero

Viruela

Puccinia cacabata

200 - 400

Maíz (7)

Mancha de
asfalto

Phyllachora maydis

200 -400

Caña de azúcar

Roya anaran-
jada

Puccinia kuehnii

200 -400



O TIA X

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

 **OXAGRO**
Biotecnologías Agrícolas

TIAX

Fungicida sistémico , protectante, curativo y antiesporulante, que combina la acción de los ingredientes activos Azoxystrobin y Tebuconazole; mientras que el primero inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento de los micelios, el segundo es un inhibidor de la biosíntesis del ergosterol, fácilmente absorbido por las partes vegetativas. Su acción es eficaz cuando se los usa preventivamente, aunque también presentan cierto efecto curativo, basado en la interferencia sobre la respiración mitocondrial. Se caracterizan por presentar una sistemia limitada o local.

Composición garantizada	P/V
Ingrediente Activo	
Azoxistrobin.....	20.0%
Tebuconazole.....	12.0%
Solvente, emulsificantes e inertes relacionados.....	68.0%
Total.....	100.0%

Cultivo	Objetivo biológico	Dosis	PC
Tomate Chile Tomatillo	Tizón temprano Cenicilla (Levillula taurica) Cenicilla (Levillula taurica)	600ml/Ha	7 días
Rosas (Rosa sp.)	Oidium (Oidium sp.) Moho gris (Botrytis cinérea)	1,25 ml/l*	No aplica
Maíz	Oidium (Oidium sp.) Moho gris (Botrytis cinérea)	600ml/Ha	No aplica



TRONOX[®]

FUNGICIDA

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

 **OXAGRO[®]**
Biotecnologías Agrícolas



TRONOX® Fungicida con actividad sistémica, translaminar y considerable acción de vapor, y efectos preventivo y erradicante. Penetra rápidamente en los tejidos atravesando la cutícula y se comporta después como sistémico con traslocación acrópeta. Fungicida de amplio espectro y que presenta acción protectante, curativa y erradicante. Se absorbe y distribuye rápidamente en los tejidos de la planta, evitando la pérdida de producto por acción de la lluvia, protegiendo eficazmente las hojas no emergidas y erradicando inmediatamente la enfermedad establecida. Es un inhibidor de la síntesis de esteroides..

Composición garantizada	PP/V
Ingrediente Activo	
Flutriafol.....	24.30%
(RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol	
Inhertes, solvente, antiespumante.....	75.70%
Total.....	100.0%

Cultivo	Objetivo biológico	Dosis	Observaciones
Algodón (21)	Pudrición Texana <i>Phymatotrichum omnivorum</i>	1.25 A 1.50	Realizar una aplicación en banda dirigida a la base de las plantas; volumen de aplicación 550 – 650 L de agua/ha
Manzano Peral (14)	Cenicilla <i>Podosphaera leucotricha</i>	0.400 A 0.500	Realizar dos aplicaciones dirigidas al follaje, a intervalo de 6 días; volumen de aplicación 670 – 770 L de agua/ha.
Trigo Cebada	Roya de la hoja <i>Puccinia hordei</i>	0.500 A 0.650	Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 200 L/ha.
Melón Sandía Pepino Calabacita	Cenicilla Polvorienta <i>Podosphaera fuliginea</i>	0.400 A 0.500	Realizar cuatro aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten las condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad.
Tomate de cascara Jitomate	Cenicilla Polvorienta <i>Leveillula taurica</i>	0.300 A 0.500	Realizar cuatro aplicaciones foliares a intervalo de 7 días.



AXOFLUM

– FUNGICIDE –

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

**OXAGRO**
Biotecnologías Agrícolas



AXOFLUM, es un fungicida ofrece una protección integral contra una amplia gama de enfermedades fúngicas, incluyendo mildiu polvoriento, roya y mancha de la hoja. Su versatilidad lo hace adecuado para aplicar en diversos tipos de cultivos, como frutas, verduras y cereales. Es una herramienta valiosa para los agricultores, ya que brinda una solución efectiva y versátil para proteger sus cultivos de enfermedades fúngicas, contribuyendo a una producción agrícola más saludable y productiva.

Composición garantizada	PP/V
Inrediente Activo:	
Azoxistrobin.....	22.5%
Flupy.....	22.5%
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyente, portador, dispersante	
humectante.....	55.0%
Total.....	100%

Cultivo	Objetivo biologico	Dosis
Chile Berenjena Tomate Jitomate (3)	Cenicilla (Leveillula taurica)	0.4 – 0.6
Manzano Peral	Cenicilla (Podosphae- ra leucotricha)	0.5
Vid (14)	Cenicilla polvorienta (Uncinula necator)	0.3 – 0.6
Fresa (SL)	Moho Gris (Botrytis cinerea)	0.5 – 0.6

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos



NEMATOCIDA



NEMAX DUO

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

 **OXAGRO**
Biotecnologías Agrícolas



NEMAX DUO® Es un fungicida nematocida eficaz para el control de nematodos, que brinda óptimo desarrollo radicular con altos estándares de seguridad para las personas y el medio ambiente. Innovador, seguro y poderoso, lo convierten en un elemento esencial para lograr cultivos sanos de calidad que respondan a las demandas actuales del mercado.

Composición garantizada PP/V
Inrediente Activo:
Fluopy:
N-{2-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridil]etil}-α,α,α-trifluoro-o-toluidina
(Equivalente a 500 g de i.a./L a 20°C)41.7.0%
Ingredientes inertes
Dispersantes,anticongelante,
antiespumante,espesante,
agente de retención.....58.30%
Total.....100.0%

Cultivo	Objetivo biologico	Dosis	Observaciones
Tomate Berenjena Tomate (SL)	Nematodo agallador Meloidogyne incognita	1.0	Protegida: Realizar la aplicación en el sistema de riego por goteo de la dosis completa (1.0 L/ha) o fraccionar la dosis a la mitad (0.5 L/ha) y aplicar la otra mitad (0.5 L/ha) a los 15 después de la primera aplicación. No aplicar más de 1.0 L por año.
Ajo Cebolla (SL)	Nematodo radicular Ditylenchus dipsaci	1.0	Realizar la aplicación al sistema de riego 15 días después del trasplante o aplicarlo durante la etapa crítica del ataque de nematodos.
Chile Habanero (SL)	Nematodo agallador Meloidogyne incognita	1.0	Protegida: Realizar la aplicación en el sistema de riego por goteo de la dosis completa (1.0 L/ha) o fraccionar la dosis a la mitad (0.5 L/ha) y aplicar la otra mitad (0.5 L/ha) a los 15 después de la primera aplicación. No aplicar más de 1.0 L por año.

BACTERICIDA



OXIGEN

B a c t e r i c i d a

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

 **OXAGRO**
Biotecnologías Agrícolas

OXIGEN

B a c t e r i c i d a

Cotton-weed®, Es un antibiótico de amplio espectro para el control preventivo y curativo de una amplia gama de bacterias que infestan los cultivos agrícolas. Los ingredientes activos son: Sulfato de Gentamicina al 10% + Clorhidrato de Oxitetraciclina al 30%. El sulfato de Gentamicina con su acción multisitio inhibe la síntesis de proteínas uniéndose irreversiblemente al ribosoma bacteriano, el Clorhidrato de Oxitetraciclina tiene un efecto sinérgico bacteriostático.

Composición garantizada	P/V
Ingrediente Activo	
Oxitetraciclina.....	30.0%
Gentamicina.....	10.0%
Ingredientes inertes	
Adhesivo, humectante, agente penetrante.....	70.0%
Total.....	100.0%

Cultivo	Objetivo biologico	Dosis
Papa (28)	Erwinia atroseptica	320 g/400 L de agua
Papa (28)	Pseudomonas solanacearum E.F. Smith	320 g/400 L de agua
Manzano, peral 21)	Erwinia amylovora	80 g/1000 L de agua
Calabacita (SL)	Pseudomonas syringae pv. lachrymans	160 - 320 g/ha
Pepino (SL)	Pseudomonas syringae pv. lachrymans	160 - 320 g/ha
Melon (SL)	Pseudomonas syringae pv. lachrymans	160 - 320 g/ha



KASU.CROP

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos



KASUCROP es un innovador agente antibacteriano y fungicida diseñado para el uso en la agricultura. Está especialmente formulado para combatir enfermedades en una amplia gama de cultivos, incluidos frutas, verduras y cereales. Contiene kasugamicina de alta pureza, un antibiótico que previene y trata eficazmente las enfermedades bacterianas y fúngicas en las plantas. Diseñado con un enfoque en la sostenibilidad, el producto tiene un bajo riesgo de desarrollar resistencia en las poblaciones de patógenos y es seguro para los polinizadores y otros insectos beneficiosos.

Composición garantizada	PP/V
Inrediente Activo:	
Kasugamicina:	
Acido [5,amino-2-metil-6-(2,3,4,5,6-pentahidrox ciclohexiloxi) tetrahidropiran-3-il]amino-alfa-iminoacético.....	2.5%
(Equivalente a 25 g de i.a./L a 20 °C)	
Ingredientes inertes	
Humectante, colorante, conservador, disolvente.....	97.5%
Total.....	100.0%

Cultivo	Objetivo biologico	Dosis	Observaciones
Papa (14)	Pudrición Blanda (Erwinia carotovora)	1 a 1.2	Cuando se inicie el programa de aplicaciones en la pre-siembra. Inicie las aplicaciones de forma preventiva. Entre la primera aplicación (en pre-siembra a la papa) y la segunda aplicación (foliar) observe un intervalo de 60 días, entre la segunda y la tercera aplicación deberán pasar 7 días.
Chile, Jitomate, Tomate de cáscara (1)	Mancha bacteriana (Xanthomonas axonopodis pv. Vesicatoria)	1.5 a 2.0 Litros/ha	Aplice al follaje cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de agua utilizado 400 L/ha.
Agave (SL)	Pudrición del Cogollo (Erwinia carotovora)	0.5 a 1.5	La primera aplicación cuando tengan síntomas iniciales de la enfermedad, dirigiendo la aplicación al cogollo de la planta.

LINEA ALGODON



Cotton-Stop

Regulador de crecimiento tipo 2

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

**OXAGRO**
Biotecnologías Agrícolas

Cotton-Stop

Regulador de crecimiento tipo 2

Cotton Stop® Las funciones principales incluyen la inhibición del crecimiento de las plantas al afectar la elongación de los tallos. Se utiliza en cultivos como el algodón para controlar el crecimiento excesivo de las plantas, lo que facilita la cosecha y mejora la calidad de la fibra de algodón. También se ha utilizado en otros cultivos, como cereales, para lograr efectos similares de control del crecimiento.

Composición garantizada	%P/PV
Ingrediente Activo	
Cloruro de mepiquat.....	24.5%
1,1-dimetilpropilo [4-(dimetilamino)-3,5-dimetilpiridinio]	
Ingredientes inertes	
Antiespumante, dispersante, humectante, anticongelante, biocida, espesante y vehículo.....	75.5%
Total.....	100.0%

Cultivo

Dosis ml/Ha

Recomendaciones de uso

ALGODONERO

150 a 200

Realizar aplicaciones despues de la primera
Floracion



Via Foliar

1 lt



5 lt



Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

OXAGRO
Biotecnologías Agrícolas



D-FOL

Cotton

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

 **OXAGRO**
Biotecnologías Agrícolas

D-FOL[®]

Cotton

Cotton D-FOL[®], Defoliante de algodón que contiene Thidiazuron al 12.5% y Diuron al 6% es una solución diseñada para la aplicación en cultivos de algodón con el propósito de facilitar la defoliación de las plantas, Contiene Thidiazuron, un agente defoliante eficaz que ayuda en la eliminación de las hojas de las plantas de algodón, además de Diuron que elimina los crecimientos apicales, evitando rebrotes. Defolia, obteniendo las mejores clases en tu algodón ya que evitamos el tabaquillo como resultado un producto de mas valor.

Composición garantizada	P/V
Ingrediente Activo	
Thidiazuron.....	12.5%
1N-fenil-N'-1,2,3-tiazol-5-ilurea.	
Diuron.....	6.0%
N'-(3,4-diclorofenil)-N,N-dimetilurea	
Ingredientes inertes	
Antiespumante, dispersante, humectante, anticongelante, biocida, espesante y vehículo.....	81.5%
Total.....	100.0%

Cultivo

Dosis ml/Ha

Recomendaciones de uso

ALGODONERO

600-1000 ml/ha

Realizar aplicacion cuando este a un 70-80% bellotas abiertas



Via Foliar

1 lt



5 lt



Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

OXAGRO
Biotecnologías Agrícolas

A close-up photograph of a hand holding a cotton boll. The background is a blurred field of cotton plants under a warm, golden sunset sky. The hand is wearing a red and blue plaid shirt.

Cotton-Weed

Herbicida

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos



Cotton-Weed

Herbicida

Cotton-weed®, se puede aplicar antes de emergencia como sellador, postemergencia cuando la maleza no revase los diez centímetros de altura, o post dirigido con combinación con algún otro herbicida permitido para cultivo de algodón. Si se mezcla con otros herbicidas, lea y siga las recomendaciones de uso, advertencias y precauciones, en la etiqueta de los herbicidas complementarios.

Composición garantizada	P/V
Ingrediente Activo	
Hormonas derivadas de sodium.....	50.0%
Ingredientes inertes	
Antiespumante, dispersante, humectante, anticongelante, biocida, espesante y vehículo.....	50.0%
Total.....	100.0%

Cultivo

Dosis ml/Ha

Recomendaciones de uso

ALGODONERO

33-43 ml/ha

Hierbas no deseadas de hoja ancha.



Via Foliar

1 lt



Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

